



OBNIŻKA VIREX 200G (ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY, GRZYBOBÓJCZY I WIRUSOBÓJCZY)

STARA CENA: PLN

PROMOCJA: **22,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DO 48 GODZIN

PRODUCENT: INNE

NUMER KATALOGOWY: 3340

OPIS PRZEDMIOTU

TERMIN WAŻNOSCI 09.2024

ALTERNATYWA DLA VIRKON S

PREPARAT VIREX TO ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE NADTLENKU O SZEROKIM SPEKTRUM ZASTOSOWANIA

KOMPOZYCJA PENTAPOTASU BIS KWASU SULFAMIDOWEGO ORAZ DICHLOROIZOCYJANURANU SODU.

- BEZPIECZNY W OBECNOŚCI ZWIERZĄT
- DEZYNFEKCJA LINII POJENIA
- DEZYNFEKCJA WSTĘPNA (OPRYSK)
- ZAMGŁAWIANIE SANITYZACJA WODY
- DEZYNFEKCJA MAT
- WYJĄTKOWO SKUTECZNY W WALCE Z GRZYBAMI

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- TAŃSZA ALTERNATYWA DLA VIRKON S
- ŚRODEK MOŻE BYĆ BEZPIECZNIE STOSOWANY W OBECNOŚCI ZWIERZĄT
- MAKSYMALNA AKTYWNOŚĆ ROZTWORU WYNOSI 5 DNI.
- ROZTWÓR UŻYTKOWY POSIADA ODCZYN KWAŚNY (PH 1% ROZTWORU =2,3)
- PREPARAT MA SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWANIA: MOŻE ZOSTAĆ UŻYTY DO: DEZYNFEKCJI LINII POJENIA, INKUBACJI JAJ, DEZYNFEKCJI OPRYSKOWEJ, JAKO ŚRODEK DO NASĄCZENIA MAT, JAK I ZAMGŁAWIANIA I SANITYZACJI WODY.
- PRODUKT POSIADA POTWIERDZONĄ SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCYJNĄ (POZWOLENIE NR 5025/12 W URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH)

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

BAKTERIE:

- ZAPALENIE POCHEWKI ŚCIĘGNA
- BACILLUS
- HELICOBACTER
- STREPTOCOCCUS
- CAMPYLOBACTER
- LISTERIA
- VIBRIO
- CLOSTRIDIUM
- PROTEUS
- ENTEROCOCCUS
- PSEUDOMONAS
- DERMATOPHILUS
- E. COLI
- SALMONELLA
- HAEMOPHILUS
- STAPHYLOCOCCUS

WIRUSY:

- ZAKAŻNA ANEMIA KURCZĄT
- CHOROBA AUSZKIEGO
- CHOROBA NIEBIESKIEGO UCHA
- (SYNDROM ROZRODCZO--ODDECHOWY)
- CHOROBA GUMBORO
- PTASIA GRYPY
- PCV2
- ZAKAŻNE ZAPALENIE NOSA I TCHAWICY U BYDŁA
- (OTRĘT BYDŁA -- IBR/IPV)
- SYNDROM SPADKU NIEŚNOŚCI
- PARWOWIRUSOWE ZAPALENIE JELIT

GRZYBY:

- MICROSPORUM
- TRICHOPHYTON

REKOMENDOWANE ILOŚCI DOZOWANIA ŚRODKA VIREX:

- **MATY DEZYNFEKCYJNE** - STOSOWAĆ W PROPORCJI 100G VIREX NA 10L WODY. MIESZAĆ DO ROZPUSTWENIA. WYMIENIAĆ W PRZYPADKU SILNEGO ZABRUDZENIA ORGANICZNEGO LUB CO 3-4 DNI.

- **OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT:** DAWKA 100G VIREX ROZPUSTWENIA W 10L WODY WYSTARCZY NA OPRYSK OBIEKTU 1000 M². VIREX MOŻE BYĆ UŻYWANY Z DODATKIEM NOŚNIKA MGŁY.

- **OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH:** UŻYĆ VIREX W STĘŻENIU MIN. 1%, ROZPROWADZIĆ PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZA LUB MYJKI CIŚNIENIOWEJ ALBO LANCĄ PIANOWĄ, W ILOŚCI OK. 300ML/M2.
 - **DEZYNFEKCJA LINII POJENIA:** UŻYĆ VIREX W STĘŻENIU OD 0,5% DO 1%, W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABRUDZENIA LINII. CAŁKOWICIE NAPEŁNIĆ INSTALACJĘ ROZTWOREM. POZOSTAWIĆ NA 3-6H. NASTĘPNIE PRZEPŁUKAĆ INSTALACJĘ CZYSTĄ WODĄ.
 - **SANITYZACJA WODY:** 400-500G VIREX ROZPUŚCIĆ W 10L WODY I APLIKOWAĆ PRZEZ DOZOWNIK USTAWIONY NA 1%.
 - **DEZYNFEKCJA PROFILAKTYCZNA:** STOSOWAĆ ROZTWÓR 0,5-1,0% (0,5/1KG PREPARATU ROZPUŚCIĆ W 100 LITRACH LETNIEJ WODY, 5,0/10,0G W 1 LITRZE LETNIEJ WODY). CZAS DZIAŁANIA 30 - 60 MINUT.
 - **DEZYNFEKCJA W OGNISKACH CHOROÓB ZAKAŻNYCH:** STOSOWAĆ ROZTWÓR 2,0%, 300 ML/M2, (2,0KG NA 100 LITRÓW LETNIEJ WODY LUB 20,0G NA 1 LITR). CZAS DZIAŁANIA 60 MINUT.
 - **DO DEZYNFEKCJI JAJ WYLĘGOWYCH:** ROZTWÓR 0,5-1,0 % W FORMIE DROBNOKROPLISTEGO OPRYSKU LUB PRZEZ ZANURZENIE W ROZTWORZE NA KILKA SEKUND. PO 10 MINUTACH OPŁUKAĆ W WODZIE I OSUSZYĆ.
 - **ZAMGŁAWIANIE:** ROZTWOREM 0,5-1,0% STOSUJE SIĘ 1 LITR ROZTWORU NA 100 M3 POMIESZCZENIA; STOSOWAĆ MECHANICZNE WYTWORNICE AEROZOLOWE.
- KIEDY UZPEŁNIĆ ŚRODEK VIREX ?**
- RÓŻOWA BARWA ROZTWORU ŚWIADCZY O AKTYWNOŚCI BIOBÓJCZEJ. ZANIK RÓŻOWEGO ZABARWIENIA ŚWIADCZY O UTRACIE SKUTECZNOŚCI BIOBÓJCZEJ